

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

| レジメン名称               | がん腫     | 登録診療科 | コース期間 | 総コース数   |
|----------------------|---------|-------|-------|---------|
| CBDCA+ PAC weekly 療法 | 非小細胞肺がん | 呼吸器内科 | 28 日間 | 4~6 コース |

### 〈投与量・投与スケジュール〉

| Rp | 薬品名 (投与量)   | 投与方法                 | 投与時間   | 投与日(day) |     |   |     |    |     |    |     |    |  |  |
|----|---|----------------------|--------|----------|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|--|--|
|    |   |                      |        | 1        | ... | 8 | ... | 15 | ... | 22 | ... | 28 |  |  |
| ①  | 生理食塩液 500mL   | 点滴※ <sup>1</sup>     | 3時間30分 | ↓        |     |   |     |    |     |    |     |    |  |  |
| ②  | デキサート注 9.9mg<br>ファモチジン注 20mg<br>生理食塩液 50mL              | 点滴(側管)※ <sup>2</sup> | 10分    | ↓        |     | ↓ |     | ↓  |     |    |     |    |  |  |
| ③  | 生理食塩液 100mL   | 点滴(側管)               | 30分    |          |     | ↓ |     | ↓  |     |    |     |    |  |  |
| ④  | グラニセトロン注 3mg<br>生理食塩液 100mL                             | 点滴(側管)               | 30分    | ↓        |     |   |     |    |     |    |     |    |  |  |
| ⑤  | <b>パクリタキセル</b> (70mg/m <sup>2</sup> )<br>ブドウ糖液 5% 250mL | 点滴(側管)※ <sup>3</sup> | 60分    | ↓        |     | ↓ |     | ↓  |     |    |     |    |  |  |
| ⑥  | <b>カルボプラチン</b> (AUC 6)<br>生理食塩液 250mL                   | 点滴(側管)               | 90分    | ↓        |     |   |     |    |     |    |     |    |  |  |
| ⑦  | 生理食塩液 50mL  | 点滴(側管)               | 5分     | ↓        |     | ↓ |     | ↓  |     |    |     |    |  |  |

### 【備考】

※<sup>1</sup> day1 のみ Rp①の側管から②・④~⑦を順番に投与

※<sup>2</sup> day8、15 のデキサート注は 6.6mg

※<sup>3</sup> 投与 30 分前にレスタミン錠 5 錠内服、PVC フリールート使用