

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
PEM+CDDP+BV 療法	非小細胞肺癌	呼吸器内科	21 日間	4～6 コース※

〈投与量・投与スケジュール〉

※4～6 コース後、増悪が認められるまで PEM+BV を継続

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日 (day)							
				1	...	8	...	15	...	21	
①	生理食塩液 500mL ブドウ糖注射液 5% 500mL	点滴	2時間30分	↓							
②	生理食塩液 500mL	点滴※ <sup>1</sup>	3時間30分	↓							
③	パロノセトロン注 0.75mg デキサート注 13.2mg 硫酸 Mg 補正液 20mL	点滴(側管)	30分	↓							
④	<b>ペメトレキセド</b> (500mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	10分	↓							
⑤	ソリタ-T3 号 200mL	点滴(側管)	30分	↓							
⑥	<b>シスプラチン</b> (75mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 500mL	点滴(側管)	120分	↓							
⑦	フロセミド注 20mg	静注	1分	↓							
⑧	生理食塩液 500mL	点滴※ <sup>2</sup>	2時間	↓							
⑨	<b>ペバシズマブ</b> (15mg/kg) 生理食塩液 100mg	点滴※ <sup>3</sup>	90～30分	↓							
⑩	生理食塩液 50mL	点滴	5分	↓							
⑪	ソリタ-T3 号 500mL	点滴	2時間	↓							
⑫	シアノコバラミン注 1mg	筋注※ <sup>4</sup>	1分	↓							

### 【備考】

※<sup>1</sup> Rp②の側管から③～⑦を順番に投与

※<sup>2</sup> Rp⑧の側管から⑨～⑩を順番に投与

※<sup>3</sup> 初回 90分、2回目 60分、3回目以降は 30分で投与

※<sup>4</sup> ペメトレキセドの副作用軽減の為に投与

初回治療では1週間前に筋注、2コース目以降はペメトレキセド投与当日に

筋注(投与期間中～投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与)

葉酸は内服投与(初回投与1週間前～投与中止後22日目まで服用、1日1回0.5mg)