対象疾患名 ： 大腸がん

レジメン名 ：(4W/C) BEV + IRIS療法

1コースの日数 ： 28日

| 備考 | | | |
|---|---|---|---|
| | BSA＜1.25 ㎡ | ： | 80 mg/日 |
| | 1.25 ㎡＜BSA＜1.50 ㎡ | ： | 100 mg/日 |
| | BSA≧1.50 ㎡ | ： | 120 mg/日 |

レジメン内容

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 点滴時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | グラニセトロンバッグ 3mg<br>デキサート注 6.6mg | 1本<br>1.5V | メイン | 30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 100mL<br>ベバシズマブ注 | 1本<br>5mg/kg | メイン | 初回90分<br>2回目60分<br>3回目以降30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 500mL<br>イリノテカン注 | 1本<br>100mg/㎡ | メイン | 1時間30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | エスワンタイホウ配合OD錠 | 備考<br>参照 | 1日2回<br>内服 | | △<br>夕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △<br>朝 | | | | | | | | | | | | | |