

対象疾患名：大腸がん

レジメン名：アービタックス + FOLFIRI療法

1コースの日数：14日

レジメン内容

Rp	薬品名	投与量	投与方法	点滴時間	Day														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	グラニセロンバッグ 3mg ポラミン注 5mg デキサート注 6.6mg	1本 1A 1.5V	メイン	30分	○														
2	生理食塩液 100mL ポラミン注 5mg デキサート注 6.6mg	1本 1A 1V	メイン	30分								○							
3	生理食塩液 250mL アービタックス注※	1本 250mg/m ²	メイン	初回 2時間 2回目以降1時間	○							○							
4	生理食塩液 100mL	1本	メイン	初回 1時間 2回目以降30分	○							○							
5	ブドウ糖5% 250mL イリノテカン注	1本 150mg/m ²	メイン	2時間	○														
6	ブドウ糖5% 250mL レボホリナート注 ※イリノテカン注と同時投与	1本 200mg/m ²	側管	2時間	○														
7	生理食塩液 50mL フルオロウラシル注	1本 400mg/m ²	メイン	全開	○														
8	ブドウ糖5% 100mL フルオロウラシル注	1本 2400mg/m ²	メイン	46時間	○														
9	生食注シリンジ 10mL	1本	メイン	フラッシュ	○														

※ 初回投与量 400 mg/m²