


## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
CapeOX+NIVO 療法	胃がん	消化器内科・外科	21 日間	規定なし

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日(day)							
				1	...	8	...	15	...	21	
①	生理食塩液 50mL	点滴	15 分	↓							
②	<b>オブジーボ</b> (360m g/body) 生理食塩液 100mL	点滴※ <sup>1</sup>	30 分	↓							
③	生理食塩液 50mL	点滴	5 分	↓							
④	パロノセトロンバッグ 0.75mg デキサート注 9.9mg	点滴	30 分	↓							
⑤	<b>オキサリプラチン</b> (130m g/m <sup>2</sup> ) ブドウ糖液 5% 500mL	点滴	120 分	↓							
⑥	生理食塩液 50mL	点滴	5 分	↓							
⑦	<b>カペシタビン</b> (2000mg/m <sup>2</sup> /日)	内服※ <sup>2</sup>	1 日 2 回 朝・夕食後	 14日間							

### 【備考】

※<sup>1</sup> PVC フリールートを使用

※<sup>2</sup> 14 日間服用 (day1 の夕食後～day15 の朝食後まで)

### 【カペシタビン投与量】

体表面積 <sup>⊕</sup>	カペシタビン基準量 <sup>⊕</sup>
1.36 m <sup>2</sup> 未満 <sup>⊕</sup>	2 4 0 0 m g/日 <sup>⊕</sup>
1.36 m <sup>2</sup> 以上・1.66 m <sup>2</sup> 未満 <sup>⊕</sup>	3 0 0 0 m g/日 <sup>⊕</sup>
1.66 m <sup>2</sup> 以上・1.96 m <sup>2</sup> 未満 <sup>⊕</sup>	3 6 0 0 m g/日 <sup>⊕</sup>
1.96 m <sup>2</sup> 以上 <sup>⊕</sup>	4 2 0 0 m g/日 <sup>⊕</sup>