

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
SP+HER療法	胃がん	消化器内科・外科	21日間	規定なし

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日(day)							
				0	1	2	...	15	...	21	
①	ソリタ-T3号 500mL×(2本)	点滴	480分	↓							
②	ソリタ-T3号 500mL	点滴	360分		↓						
③	生理食塩液 500mL ブドウ糖液 5%500mL	点滴	180分		↓						
④	生理食塩液 500mL	点滴※ <sup>1</sup>	420分		↓						
⑤	パロノセトロンバッグ 0.75mg デキサート注 13.2mg 硫酸 Mg 補正液 20mL	点滴(側管)	30分		↓						
⑥	<b>トラスツズマブ</b> (8mg/kg) 生理食塩液 250mL	点滴※ <sup>2</sup> (側管)	90~30分		↓						
⑦	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5分		↓						
⑧	<b>シスプラチン</b> (60mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 250mL	点滴(側管)	120分		↓						
⑨	フロセミド注 20mg	静注(側管)	1分		↓						
⑩	ソリタ-T3号 500mL×(2本)	点滴	480分		↓						
⑪	ソリタ-T3号 500mL×(3本)	点滴	600分			↓					
⑫	<b>S-1</b> (80mg/m <sup>2</sup> /日)	内服※ <sup>3</sup>	1日2回 朝・夕食後	 <b>14日間</b>							

【備考】

※<sup>1</sup> Rp④の側管から⑤~⑨を順番に投与

※<sup>2</sup> 投与量：初回 8mg/kg、2回目以降は 6mg/kg

投与時間：初回 90分、2回目以降は 30分で投与

※<sup>3</sup> 14日間服用(day1の夕食後~day15の朝食後まで)

【S-1投与量】

体表面積	S-1初回基準量
1.25 m <sup>2</sup> 未満	80 mg/日
1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5 m <sup>2</sup> 未満	100 mg/日
1.5 m <sup>2</sup> 以上	120 mg/日