

【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
XP+HER療法	胃がん	消化器内科・外科	21日間	規定なし

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日(day)							
				0	1	2	...	15	...	21	
①	ソリタ-T3号 500mL×(2本)	点滴	480分	↓							
②	ソリタ-T3号 500mL	点滴	360分		↓						
③	生理食塩液 500mL ブドウ糖液 5%500mL	点滴	180分		↓						
④	生理食塩液 500mL	点滴※ ¹	420分		↓						
⑤	パロノセトロンバッグ 0.75mg デキサート注 13.2mg 硫酸 Mg 補正液 20mL	点滴(側管)	30分		↓						
⑥	トラスツズマブ (8mg/kg) 生理食塩液 250mL	点滴※ ² (側管)	90~30分		↓						
⑦	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5分		↓						
⑧	シスプラチン (80mg/m ²) 生理食塩液 250mL	点滴(側管)	120分		↓						
⑨	フロセミド注 20mg	静注(側管)	1分		↓						
⑩	ソリタ-T3号 500mL×(2本)	点滴	480分		↓						
⑪	ソリタ-T3号 500mL×(3本)	点滴	600分			↓					
⑫	カペシタピン (2000mg/m ² /day)	内服※ ³	1日2回 朝・夕食後								

【備考】

※¹ Rp④の側管から⑤~⑨まで順番に投与

※² 投与量 : 初回 8mg/kg、2回目以降は 6mg/kg

投与時間: 初回 90分、2回目以降は 30分で投与

※³ 14日間服用(day1の夕食後~day15の朝食後まで)

【カペシタピン投与量】

体表面積 [Ⓐ]	カペシタピン基準量 [Ⓐ]
1.36 m ² 未満 [Ⓐ]	2 4 0 0 m g /日 [Ⓐ]
1.36 m ² 以上・1.66 m ² 未満 [Ⓐ]	3 0 0 0 m g /日 [Ⓐ]
1.66 m ² 以上・1.96 m ² 未満 [Ⓐ]	3 6 0 0 m g /日 [Ⓐ]
1.96 m ² 以上 [Ⓐ]	4 2 0 0 m g /日 [Ⓐ]