

対象疾患名：悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）

レジメン名：Gd-R療法

1コースの日数：21日

レジメン内容

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 点滴時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | グラニセロンバッグ 3mg デキサート注 6.6mg | 1本 5V | メイン | 30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | グラニセロンバッグ 3mg | 1本 | メイン | 30分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ブドウ糖5% 100mL ゲムシタピン注 | 1本 1000mg/ m ² | メイン | 30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 500mL リツキシマブ注 [※] | 1本 375mg/m ² | メイン | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | フラッシュ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | デカドロン錠 | 40mg/day | 内服 | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※リツキシマブ投与30分前にカロナール錠(200)3T、ポララミン錠(2)1T 内服

備考

【初回】点滴の速さを8段階(50mL/hr→100mL/hr→150mL/hr→200mL/hr→250mL/hr→300mL/hr→350mL/hr→400mL/hr)に分けて30分毎上げる。

【2回目以降】点滴の速さを4段階(100mL/hr、200mL/hr→300mL/hr→400mL/hr)に分けて30分毎上げる。