

対象疾患名：悪性リンパ腫（非ホジキンリンパ腫）

レジメン名：R-CHOP療法

1コースの日数：21日

レジメン内容

Rp	薬品名	投与量	投与方法	点滴時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	グラニセトロンバッグ 3mg	1本	メイン	30分	○																				
2	生理食塩液 100mL ドキシソルビシン注	1本 50mg/m <sup>2</sup>	メイン	30分	○																				
3	生理食塩液 50mL オンコビン注	1本 1.4mg/m <sup>2</sup>	メイン	全開	○																				
4	生理食塩液 500mL エンドキサン注	1本 750mg/m <sup>2</sup>	メイン	2時間	○																				
5	生理食塩液 50mL	1本	メイン	フラッシュ	○																				
6	生理食塩液 100mL	1本	メイン	30分		○																			
7	生理食塩液 500mL リツキシマブ注 <sup>※</sup>	1本 375mg/m <sup>2</sup>	メイン	備考		○																			
8	生理食塩液 50mL	1本	メイン	フラッシュ		○																			
9	プレドニゾン錠	100mg/body	内服		○	○	○	○	○																

※リツキシマブ投与30分前にカロナール錠(200)3T、ポララミン錠(2)1T 内服

備考

【初回】点滴の速さを8段階(50mL/hr→100mL/hr→150mL/hr→200mL/hr→250mL/hr→300mL/hr→350mL/hr→400mL/hr)に分けて30分毎上げる。

【2回目以降】点滴の速さを4段階(100mL/hr、200mL/hr→300mL/hr→400mL/hr)に分けて30分毎上げる。