

【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
(ショート)キイトルーダ+PEM+CDDP 療法	非小細胞肺がん	呼吸器内科	21 日間	4 コース※

※4 コース後、増悪が認められるまでキイトルーダ+PEM を継続

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日 (day)						
				1	...	8	...	15	...	21
①	生理食塩液 50mL	点滴	15 分	↓						
②	キイトルーダ (200mg/body) 生理食塩液 100mL	点滴※ ¹	30 分	↓						
③	生理食塩液 50mL	点滴	5 分	↓						
④	パロノセトロン注 0.75mg デキサート注 9.9mg 硫酸 Mg 補正液 20mL	点滴	30 分	↓						
⑤	ペメトレキセド (500mg/m ²) 生理食塩液 100mL	点滴	10 分	↓						
⑥	ソリタ-T3 号 500mL	点滴	1 時間	↓						
⑦	シスプラチン (75mg/m ²) 生理食塩液 500mL	点滴	60 分	↓						
⑧	フロセミド注 20mg	静注	1 分	↓						
⑨	生理食塩液 500mL	点滴	1 時間	↓						
⑩	ソリタ-T3 号 500mL	点滴	1 時間	↓						
⑪	シアノコバラミン注 1mg	筋注※ ²	1 分	↓						

【備考】

※¹ PVC フリールートを使用

※² ペメトレキセドの副作用軽減の為に投与初回治療では1週間前に筋注、2コース目以降はペメトレキセド投与当日に筋注(投与期間中～投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与)
葉酸は内服投与(初回投与1週間前～投与中止後22日目まで服用、1日1回0.5mg)