

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
ABCP 療法	非小細胞肺癌	呼吸器内科	21 日間	4~6 コース※

〈投与量・投与スケジュール〉

※4~6 コース後、増悪が認められるまでテセントリク+ベバシズマブ継続

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日 (day)								
				1	...	8	...	15	...	21		
①	生理食塩液 500mL	点滴※ <sup>1</sup>	480 分	↓								
②	<b>テセントリク</b> (1200mg/body) 生理食塩液 250mL	点滴(側管)※ <sup>2</sup>	初回 60 分	↓								
③	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5 分	↓								
④	デキサート注 13.2mg ファモチジン注 20mg 生理食塩液 50mL	点滴(側管)	10 分	↓								
⑤	グラニセトロン注 3mg 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	30 分	↓								
⑥	<b>パクリタキセル</b> (200mg/m <sup>2</sup> ) ブドウ糖液 5%500mL	点滴(側管)※ <sup>3</sup>	180 分	↓								
⑦	<b>カルボプラチン</b> (AUC 5) 生理食塩液 250mL	点滴(側管)	90 分	↓								
⑧	<b>ベバシズマブ</b> (15mg/kg) 生理食塩液 100mL	点滴(側管)※ <sup>4</sup>	初回 90 分	↓								
⑨	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5 分	↓								

### 【備考】

※<sup>1</sup> : Rp①の側管から②~⑨を順番に投与

※<sup>2</sup> : 投与時間 : 初回 60 分、2 回目以降 30 分で投与  
PVC フリールートを使用

※<sup>3</sup> : 投与 30 分前にレスタミン錠 5 錠内服、PVC フリールートを使用

※<sup>4</sup> : 投与時間 : 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分で投与