

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
BV+PEM 療法	非小細胞肺がん	呼吸器内科	21 日間	規定なし

### 〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日 (day)							
				1	...	8	...	15	...	21	
①	生理食塩液 250mL	点滴※ <sup>1</sup>	3 時間	↓							
②	グラニセトロン注 3mg デキサート注 6.6mg 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	30 分	↓							
③	<b>ペメトレキセド</b> (500mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	10 分	↓							
④	生理食塩液 100mL	点滴(側管)	30 分	↓							
⑤	<b>ペバシズマブ</b> (15mg/kg) 生理食塩液 100mL	点滴(側管)※ <sup>2</sup>	90～30 分	↓							
⑥	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5 分	↓							
⑦	シアノコバラミン注 1mg	筋注※ <sup>3</sup>	1 分	↓							

### 【備考】

※<sup>1</sup> Rp①の側管から②～⑥を順番に同時投与

※<sup>2</sup> 投与時間：初回は 90 分、2 回目は 60 分、3 回目以降は 30 分 で投与

※<sup>3</sup> ペメトレキセドの副作用軽減の為に投与

初回治療では 1 週間前に筋注、2 コース目以降はペメトレキセド投与当日に筋注(投与期間中～投与中止後 22 日目まで 9 週ごとに 1 回投与)

葉酸は内服投与(初回投与 1 週間前～投与中止後 22 日目まで服用、1 日 1 回 0.5mg)