

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
CBDCA+PEM 療法	非小細胞肺癌	呼吸器内科	21 日間	4 コース※

※4 コース終了時に PD 以外の場合、維持療法として PEM を継続

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日(day)						
				1	...	8	...	15	...	21
①	YD ソリタ T3 号 500mL	点滴※ <sup>1</sup>	3 時間	↓						
②	グラニセトロン注 3mg デキサート注 6.6mg	点滴(側管)	30 分	↓						
③	<b>ペメトレキセド</b> (500mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	10 分	↓						
④	生理食塩液 100mL	点滴(側管)	30 分	↓						
⑤	<b>カルボプラチン</b> (AUC 5-6) 生理食塩液 250mL	点滴(側管)	90 分	↓						
⑥	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5 分	↓						
⑦	シアノコバラミン注 1mg	筋注※ <sup>2</sup>	1 分	↓						

### 【備考】

※<sup>1</sup> Rp①の側管から②～⑥を順番に投与

※<sup>2</sup> ペメトレキセドの副作用軽減の為に投与

初回治療では1週間前に筋注、2コース目以降はペメトレキセド投与当日に筋注(投与期間中～投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与)

葉酸は内服投与(初回投与1週間前～投与中止後22日目まで服用、1日1回0.5mg)