

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
キイトルーダ+PEM+CDDP 療法	非小細胞肺がん	呼吸器内科	21 日間	4 コース

〈投与量・投与スケジュール〉

※ 4 コース後、増悪が認められるまでキイトルーダ+PEM を継続

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日 (day)						
				1	...	8	...	15	...	21
①	生理食塩液 50mL	点滴	15 分	↓						
②	<b>キイトルーダ</b> (200mg/body) 生理食塩液 100mL	点滴※ <sup>1</sup>	30 分	↓						
③	生理食塩液 500mL ブドウ糖液 5%500mL	点滴	2 時間 30 分	↓						
④	生理食塩液 500mL	点滴※ <sup>2</sup>	3 時間 30 分	↓						
⑤	パロノセトロンバッグ 0.75mg デキサート注 13.2mg 硫酸 Mg 補正液 20mL	点滴(側管)	30 分	↓						
⑥	<b>ペメトレキセド</b> (500mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	10 分	↓						
⑦	ソリタ-T3 号 200mL	点滴(側管)	30 分	↓						
⑧	<b>シスプラチン</b> (75mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 500mL	点滴(側管)	120 分	↓						
⑨	フロセミド注 20mg	点滴(側管)	1 分	↓						
⑩	ソリタ-T3 号 500mL 2 本	点滴	4 時間	↓						
⑪	シアノコバラミン注 1mg	筋注※ <sup>3</sup>	1 分	↓						

### 【備考】

※<sup>1</sup> PVC フリールートを使用

※<sup>2</sup> ④の側管から⑤～⑨を順番に投与

※<sup>3</sup> ペメトレキセドの副作用軽減の為に投与

初回治療では 1 週間前に筋注、2 コース目以降はペメトレキセド投与当日に筋注  
(投与期間中～投与中止後 22 日目まで 9 週ごとに 1 回投与)

葉酸は内服投与(初回投与 1 週間前～投与中止後 22 日目まで服用、1 日 1 回 0.5mg)