

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

| レジメン名称            | がん腫    | 登録診療科 | コース期間 | 総コース数    |
|-------------------|--------|-------|-------|----------|
| (ショート)PEM+CDDP 療法 | 非小細胞肺癌 | 呼吸器内科 | 21 日間 | 4～6 コース※ |

※4～6 コース後、増悪が認められるまで PEM を継続

〈投与量・投与スケジュール〉

| Rp | 薬品名 (投与量)   | 投与方法             | 投与時間 | 投与日 (day) |     |   |     |    |     |    |  |
|----|---|------------------|------|-----------|-----|---|-----|----|-----|----|--|
|    |   |                  |      | 1         | ... | 8 | ... | 15 | ... | 21 |  |
| ①  | パロノセトロン注 0.75mg<br>デキサート注 9.9mg<br>硫酸 Mg 補正液 20mL     | 点滴               | 30 分 | ↓         |     |   |     |    |     |    |  |
| ②  | <b>ペメトレキセド</b> (500mg/m <sup>2</sup> )<br>生理食塩液 100mL | 点滴               | 10 分 | ↓         |     |   |     |    |     |    |  |
| ③  | ソリタ-T3 号 500mL  | 点滴               | 1 時間 | ↓         |     |   |     |    |     |    |  |
| ④  | <b>シスプラチン</b> (75mg/m <sup>2</sup> )<br>生理食塩液 500mL   | 点滴               | 60 分 | ↓         |     |   |     |    |     |    |  |
| ⑤  | フロセミド注 20mg   | 静注               | 1 分  | ↓         |     |   |     |    |     |    |  |
| ⑥  | 生理食塩液 500mL   | 点滴               | 1 時間 | ↓         |     |   |     |    |     |    |  |
| ⑦  | ソリタ-T3 号 500mL  | 点滴               | 1 時間 | ↓         |     |   |     |    |     |    |  |
| ⑧  | シアノコバラミン注 1mg   | 筋注※ <sup>1</sup> | 1 分  | ↓         |     |   |     |    |     |    |  |

### 【備考】

※<sup>1</sup> ペメトレキセドの副作用軽減の為に投与

初回治療では1週間前に筋注、2コース目以降はペメトレキセド投与当日に筋注(投与期間中～投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与)

葉酸は内服投与(初回投与1週間前～投与中止後22日目まで服用、1日1回0.5mg)