対象疾患名 ： 大腸がん

レジメン名 ：（Biweekly）アービタックス + FOLFIRI療法

1コースの日数 ： 14日

レジメン内容

Rp	薬品名	投与量	投与方法	点滴時間	Day													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	グラニセトロンバッグ 3mg ポララミン注 5mg デキサート注 6.6mg	1本 1A 1.5V	メイン	30分	○													
2	生理食塩液 250mL アービタックス注	1本 500mg/㎡	メイン	初回 2時間 2回目以降 10mg/min	○													
3	生理食塩液 100mL	1本	メイン	初回 1時間 2回目以降30分	○													
4	ブドウ糖5% 250mL イリノテカン注	1本 150mg/㎡	メイン	2時間	○													
5	ブドウ糖5% 250mL レボホリナート注 ※イリノテカン注と同時投与	1本 200mg/㎡	側管	2時間	○													
6	生理食塩液 50mL フルオロウラシル注	1本 400mg/㎡	メイン	全開	○													
7	ブドウ糖5% 100mL フルオロウラシル注	1本 2400mg/㎡	メイン	46時間	○													
8	生食注シリンジ 10mL	1本	メイン	フラッシュ	○													