対象疾患名 ： 大腸がん

レジメン名 ： ベクティビックス + mFOLFOX6療法

1コースの日数 ： 14日

レジメン内容

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 点滴時間 | Day | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | グラニセトロンバッグ 3mg<br>ポララミン注 5mg<br>デキサート注 6.6mg | 1本<br>1A<br>1.5V | メイン | 30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 100mL<br>ベクティビックス注 | 1本<br>6mg/kg | メイン | 1時間 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ブドウ糖5% 250mL<br>オキサリプラチン注 | 1本<br>85mg/㎡ | メイン | 2時間 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ブドウ糖5% 250mL<br>レボホリナート注<br>※オキサリプラチン注と同時投与 | 1本<br>200mg/㎡ | 側管 | 2時間 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 生理食塩液 50mL<br>フルオロウラシル注 | 1本<br>400mg/㎡ | メイン | 全開 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ブドウ糖5% 100mL<br>フルオロウラシル注 | 1本<br>2400mg/㎡ | メイン | 46時間 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 生食注シリンジ 10mL | 1本 | メイン | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | |