

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
S-1+PAC 療法	胃がん	消化器内科・外科	21 日間	規定なし

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日 (day)							
				1	...	8	...	15	...	21	
①	ファモチジン注 20m g デキサート注 6.6m g 生理食塩液 50mL	点滴	10 分	↓		↓					
②	生理食塩液 100mL	点滴	30 分	↓		↓					
③	<b>パクリタキセル</b> (50mg/m <sup>2</sup> ) ブドウ糖液 5% 250mL	点滴※ <sup>1</sup>	60 分	↓		↓					
④	生理食塩液 50mL	点滴	5 分	↓		↓					
⑤	<b>S-1</b> (80mg/m <sup>2</sup> /day)	内服※ <sup>2</sup>	1 日 2 回 朝・夕食後								

### 【備考】

※<sup>1</sup> 投与 30 分前にレスタミン 5 錠内服

PVC フリールートを使用

※<sup>2</sup> 14 日間服用(day1 の夕食後～day15 の朝食後まで)

### 【S-1 投与量】

体表面積	S-1 初回基準量
1.25 m <sup>2</sup> 未満	80 mg/日
1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5 m <sup>2</sup> 未満	100 mg/日
1.5 m <sup>2</sup> 以上	120 mg/日