

【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

| レジメン名称 | がん腫 | 登録診療科 | コース期間 | 総コース数 |
|-----------|-----|-------|-------|-------|
| PAC+BV 療法 | 乳がん | 外科 | 28 日間 | 規定なし |

〈投与量・投与スケジュール〉

| Rp | 薬品名 (投与量) | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 (day) | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---------|-----------|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|--|--|
| | | | | 1 | ... | 8 | ... | 15 | ... | 22 | ... | 28 | | |
| ① | ファモチジン注 20m g デキサート注 6.6m g 生理食塩液 50mL | 点滴 | 10 分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | |
| ② | 生理食塩液 100mL | 点滴 | 30 分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | |
| ③ | パクリタキセル (80mg/m ²) ブドウ糖液 5% 250mL | 点滴※ ¹ | 60 分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | |
| ④ | 生理食塩液 50mL | 点滴 | 5 分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | | |
| ⑤ | ペバシズマブ (10mg/kg) 生理食塩液 100mL | 点滴※ ² | 90~30 分 | ↓ | | | | ↓ | | | | | | |
| ⑥ | 生理食塩液 50mL | 点滴 | 5 分 | ↓ | | | | ↓ | | | | | | |

【備考】

※¹ 投与 30 分前にレスタミン 5 錠内服、PVC フリールートを使用

※² 投与時間：初回は 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 で投与