

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
DCF 療法	食道がん	消化器内科・外科	28 日間	規定なし

### 〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日(day)										
				0	1	2	3	4	5	6	...	28		
①	ソリタ-T3号 500mL 2本	点滴	8時間	↓										
②	生理食塩液 500mL ブドウ糖液 5%500mL	点滴	8時間		↓									
③	生理食塩液 500mL	点滴※ <sup>1</sup>	4時間		↓									
④	パロノセトロンバッグ 0.75mg デキサート注 13.2mg 硫酸 Mg 補正液 20mL	点滴(側管)	30分		↓									
⑤	<b>ドセタキセル</b> (70mg/m <sup>2</sup> ) ブドウ糖液 5%250mL	点滴(側管)	60分		↓									
⑥	<b>シスプラチン</b> (75mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 250mL	点滴(側管)	120分		↓									
⑦	フロセミド注 20mg	静注(側管)	1分		↓									
⑧	<b>フルオロウラシル</b> (800mg/m <sup>2</sup> ) ソリタ-T3号 500mL	点滴※ <sup>2</sup>	24時間		↓	↓	↓	↓	↓					
⑨	ソリタ-T3号 500mL 3本	点滴(側管)	12時間		↓	↓								
⑩	生理食塩液 50mL	点滴	5分									↓		

### 【備考】

※<sup>1</sup>: Rp ③の側管から Rp ④～⑦を順番に投与

※<sup>2</sup>: フルオロウラシルは 24 時間持続 (時間調整可)、Rp ⑧の側管から Rp ⑨を投与